

דימום תוך עיני כביטוי של זיהום חד בנגיף אפשטיין-בר

דן פלדר¹
אפריים בילבסקי^{2,1}
יעקב אמיר^{2,1}
ערן רום¹
קרן שחרניסן¹

¹מחלקות לרפואת ילדים ג', מרכז שניידר לרפואת ילדים, פתח תקווה
²הפקולטה לרפואה סאקלר, אוניברסיטת תל אביב, רמת אביב

החולים הללו לווה הדימום בתסמינים תוך עיניים נוספים, ביניהם אובדן ראייה וכאב, ובמצבים נוספים בבדיקת עיניים, כמו דלקת חדה בלחמית ודלקת הענבייה (אובאיטיס).

לסיכום

זיהום בנגיף אפשטיין-בר עשוי להביא למכלול נרחב של ביטויים קליניים. דימומים תת-לחמיתיים זו צדדיים הם ביטוי נוסף לפגיעה מנגיף זה.

מחבר מכותב: דן פלדר

מחלקת ילדים ג'

מרכז שניידר לרפואת ילדים

רחוב קפלן 14, פתח תקווה 49202

טלפון: 03-9253680

פקס: 03-9253056

דוא"ל: felderdan12@gmail.com

במהלך אשפוזו של הנער, בוצעה בדיקה סרולוגית שאיששה את האבחנה של זיהום חד בנגיף אפשטיין-בר. הוא טופל תמיכתית עם שיפור קליני ניכר. בבדיקת רופא עיניים נמצאו דימומים תת לחמיתיים בלבד, ללא כל ממצא לפתולוגיה נלווית אחרת בעיניים. באבחנה מבדלת לדימום תת לחמיתי נכללות סיבות שונות הכוללות: טראומה, שבריריות יתר של כלי הדם בלחמית, ליקויי קרישה, יתר לחץ-דם, ותמרון וולסלבה (Valsalva maneuver) אגרסיבי, לדוגמה לאחר שיעול חזק או הקאה [1]. הנער שטופל במחלקתנו שלל את כל הסיבות המוזכרות. בסקירת ספרות שערכנו אותו רק שתי פרשות חולים נוספות שדווח בהן על דימומים תת לחמיתיים בעקבות זיהום בנגיף אפשטיין בר [2,3]. באחת מפרשות

מפרשת החולה

צעיר בן 18 שנים, ברקע בריא ומחוסן כפי גילו, התקבל לאשפוז בגין חום, כאבי ראש, חולשה וכאבי גרון מזה עשרה ימים טרם התקבלותו. חמישה ימים טרם התקבלותו בעקבות אבחנה של דלקת גרון חידקית סטרפטוקוקית (ללא לקיחת תרבות לוע), הוחל טיפול אמבולטורי באמוקסיצילין. בעקבות הטיפול הופיעה תיפרחת כתמית נקודתית (מקולופולרית) שהתפשטה על פני הגפיים, הגו והפנים. בנוסף לתיפרחת (Rash) האמורה, נצפו בבדיקתו הגופנית בהתקבלותו למחלקה שקדיים מוגדלים מכוסים בתפליטים, שריעות הטחול אשר מושש 2 ס"מ מתחת לקו הצלעות, ואודם זו צדדי בלחמיות (תמונה 1).

תמונה 1:

דימומים תוך לחמיתיים



ביבליוגרפיה

1. Leibowitz HM, The red eye. N Engl J Med, 2000;343:345-51.
2. Kanafani ZA, Bashur Z & Kanj SS, Acute Epstein-Barr virus infection causing bilateral conjunctival hemorrhages. South Med J, 2005;98:390-1.
3. Heiligenhaus A, Dohrmann J, Koch J & al, A severe bilateral panuveitis in a patient with asymptomatic Epstein-Barr virus infection. Eye, 2001; 15:792-793.