

דצמבר 2014

רופא/ה נכבד/ה,
רוקח/ת נכבד/ה,

הנדון: החמרות בעלון לצרכן

Acnetrim Solution

חומר פעיל: Erythromycin 2% אריתרומיצין 2%

הרינו להודיעכם כי חל עדכון בעלון לצרכן של התכשיר שבנדון, המאושר להתוויה:
Topical antibiotic treatment for all forms of acne, particularly inflammatory acne with papules and pustules.

מהות העדכון:

1. מעבר לפורמט עלון חדש עפ"י נוהל משרד הבריאות.

2. עדכון הפסקאות הבאות:

- **התוויה – תיקון ניסוח.**
- **אזהרות – הוספת ההנחיות הבאות:**
 - להימנע משימוש באקנתרים על עור פגוע.
 - להיוועץ ברופא לפני שימוש אם המטופל סבל בעבר מדלקת המעי הגס (קוליטיס) עקב טיפול באנטיביוטיקה או ממחלה דלקתית של המעי או אם המטופלת בהריון, מתכננת להיכנס להריון או מניקה.
- **תגובות בין תרופתיות – הוספת התייחסות לאנטיביוטיקה ולתכשיר אחר לטיפול מקומי באקנה (כגון: תכשיר המכיל קלינדמיצין).**
- **הריון והנקה – הוספת התייחסות למצב בו המטופלת מתכננת הריון (עליה להיוועץ ברופא לפני שימוש בתרופה).**
- **מידע חשוב על מרכיבי התרופה – הוספת התייחסות לכך שהתכשיר מכיל פרופילן גליקול ואלכוהול.**
- **תופעות לוואי -**
 - הוספת תופעות הלוואי הבאות המחייבות הפסקת טיפול ופניה מיידית לרופא: סימני אלרגיה כגון: נפיחות בפנים, בשפתיים, בעפעפיים או בלשון, קוצר/קשיי נשימה, שלשול חריף או ממושך.
 - הוספת תופעות הלוואי הבאות ששכיחותן אינה ידועה: שלשול, אי נוחות או כאב בטן, גרד.
 - הוספת תופעת לוואי שכיחה מאוד: עקצוצים במקום המריחה.
 - הוספת/תיקון שכיחות תופעות הלוואי.
- **אחסון התרופה –**
 - הוספת הנחיה להרחיק מקרינת שמש ישירה

העלון מפורסם במלואו במאגר התרופות שבאתר האינטרנט של משרד הבריאות וניתן לקבלו מודפס ע"י פניה לבעל הרישום, חברת תרימה, תוצרי רפואה ישראליים מעברות בע"מ, קיבוץ מעברות 4023000, טלפון: 074-7141147.

בברכה,



אילנה שוויגמן-לוי
רוקחת ממונה

תרימה, תוצרי רפואה ישראליים מעברות בע"מ

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו – 1986
התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

אקנתרים

תמיסה

חומר פעיל: אריתרומיצין 2% Erythromycin
חומרים בלתי פעילים בתכשיר - ראה סעיף 6 "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו נרשמה לטיפול עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.
התרופה אינה מיועדת לילדים ולמתבגרים מתחת לגיל 12 שנים.

1. למה מיועדת התרופה?

טיפול אנטיביוטי מקומי ב"פצעי בגרות" (אקנה) ובמיוחד בפצעי בגרות דלקתיים עם חטטים מוגלתיים (inflammatory acne with papules and pustules).

קבוצה תרפויטית: אנטיביוטיקה ממשפחת המאקרולידים.

2. לפני שימוש בתרופה

⚠ אין להשתמש בתרופה:

- אם אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה.
- בילדים מתחת לגיל 12 שנים.

לפני הטיפול באקנתרים ספר לרופא אם:

- סבלת בעבר מדלקת המעי הגס (קוליטיס) עקב טיפול באנטיביוטיקה (מתבטא בשלשול ממושך וחריף או דמוי או ממחלה דלקתית של המעי.
- היך בהריון, מתכננת הריון או מניקה.

⚠ אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

- אם הנך רגיש למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עלִיך להודיע על כך לרופא לפני השימוש בתרופה.
- אין להשתמש באקנתרים סמוך לעיון, באף, בפה או בקומים ריריים.
- בעת הטיפול באקנתרים רצוי להימנע משימוש בחומרים המייבשים את העור.
- עליך להפריד בין שימוש בתרופה זו לשימוש בתרופות או בתכשירים קוסמטיים לפרק זמן של שעה לפחות.
- יש להימנע משימוש באקנתרים על עור פגוע (חתכים, כוויות שמש וכד').

⚠ אם אתה משתמש או אם השתמשת לאחרונה בתרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח, במיוחד אם אתה משתמש באנטיביוטיקה או בתכשיר אחר לטיפול מקומי באקנה (כגון: תכשיר המכיל קלינדמיצין).

⚠ הריון והנקה

אם הינך בהריון, מתכננת הריון או מניקה יש להיוועץ ברופא לפני שימוש בתרופה.

⚠ עישון

הימנע מטיפול באקנתרים ליד אש גלויה או בעת העישון.

⚠ מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

המרכיב פרופילן גליקול המצוי בתמיסה עשוי לגרום לגירוי העור.
התכשיר מכיל גם אלכוהול, שבמגע בעיניים עשוי לגרום לצריבה. במידה והתכשיר נכנס לעיניים, לפה או בא במגע עם עור פגום, יש לשטוף את האזור תחת מי ברז זורמים.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

תמיד יש להשתמש לפי הוראות הרופא.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. המינון המקובל בדרך כלל הוא:

ל**מתבגרים** ול**ילדים מעל גיל 12**: לאחר ניקוי העור, מרח היטב אקנתרים על כל אזורי העור הנגועים פעמיים ביום: בוקר וערב. במקרים של התפתחות יובש יתר באזורים המטופלים ישקול הרופא הפחתת תדירות הטיפול לפעם ביום. יש למרוח לפי הוראות הרופא ולהשלים את כל הטיפול התרופתי. רצוי להימנע משטיפת האזורים הנגועים לעיתים קרובות מדי כדי למנוע ייבוש העור והחמרת מצבו.

אין לעבור על המנה המומלצת.

תרופה זו אינה מיועדת לילדים ולמתבגרים מתחת לגיל 12 שנים.

אין לבלוע! לשימוש חיצוני בלבד.

הוראות פתיחה: לפתיחה ראשונה של הבקבוק יש ללחוץ בחוזקה באצבע נקיה על מרכז הספוגית.

משך הטיפול: אם לא חל שיפור במצבך תוך חודש יש לפנות לרופא.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

אם שכחת למרוח תרופה זו בזמן הדרוש, אין למרוח מנה כפולה. המשך למרוח את המנה הבאה כרגיל.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה **בכל פעם** שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש באקנתרים עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

יש להפסיק את השימוש ולפנות מיד לרופא אם מתפתחות התופעות הבאות:

- פריחה או דלקת מקומית (שלא היו קיימים לפני השימוש בתכשיר).
- סימני אלרגיה כגון: נפיחות בפנים, בשפתיים, בעפעפיים או בלשון, קוצר/קשיי נשימה.
- שלשול חריף או ממושך.

תופעות לוואי נוספות:

תופעות לוואי שכיחות מאוד

- צריבה, תחושת בעירה בעור
- גירוי בעור
- יובש בעור, אודם בעור (במיוחד בתחילת הטיפול)
- קעקציים במקום המריחה.

תופעות לוואי ששכיחותן אינה ידועה

• שלשול, אי נוחות או כאב בטן, גרד.

אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא הזכרנה בעלון, עלִיך להתייעץ עם הרופא.

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך למנע הרעלה. אל תגרום להקאה לללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date). המופיע על גבי הבקבוק או האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- יש לאחסן במקום קריר, מתחת ל- 25°C.
- זהירות! חומר דליק, הרחק מאש ומקרינת שמש ישירה!
- יש לסגור את הבקבוק היטב למניעת התנדפות החומר.


6. מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:

- Alcohol, propylene glycol, oleyl alcohol, perfume essence.
- כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה?** בכל אריזה קבוק זכוכית המכיל 25 מ"ל תמיסה שקופה.
- יצרן ובעל הרישום:** תרימה, תוצרי רפואה ישראליים מעברות בע"מ. מעברות 4023000, ישראל.
- עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות באוגוסט 2014.
- מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 035.38.25621.00
- לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לשני המינים.

	מעברות 4023000
	תוצרי רפואה ישראליים
	מעברות בע"מ

09140



נְשֵׁרָה לַמְּסֻחָלַק בַּמּוֹצֵיב אֲנֻזְמַתָּה הַסְּוִידָלָה (מְסַחְחָרַת) – 1986

יִסְוֹף הַדּוּאָה חֲסַב וּסְפָה טִיבִיב פֻּקַּט

אקנתרים

מחلول

המادة الفعالة: إريثروמיסین 2% Erythromycin

المواد غير الفعالة في المستحضر – انظر الفقرة ٦ «معلومات إضافية».

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وصف هذا الدواء للعلاج من آجلك. لا تعطيه للأطفال وللراهقين دون عمر ١٢ سنة.
لحالتك.

الدواء غير مخصص للأطفال وللراهقين دون عمر ١٢ سنة.

١) لأي غرض مخصص الدواء؟

علاج موضعي بمضاد حيوي لـ «حب الشباب» (acne) وخاصة حب الشباب الإلتهابي المترافق ببثور متفيجة (inflammatory acne with papules and pustules)

الفصيلة العلاجية: مضاد حيوي من فصيلة الماكروليدات.

٢) قبل إستعمال الدواء

⚠ لا يجوز إستعمال الدواء:

- إذا كنت حساساً (البرجي) للمادة الفعالة أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء.
- لدى الأطفال دون عمر ١٢ سنة.

قبل العلاج باكنتريم إحك للطبيب إذا:

- عانيت في الماضي من الإتهاب في الأمعاء الغليظة (colitis) إثر العلاج بمضاد حيوي (الذي يتمثل بإسهاال متواصل وشديد أو دموي) أو من مرض الإتهابي في الأمعاء.
- كنت في فترة الحمل، تخططين للحمل أو في فترة الرضاعة.

⚠ تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

- إذا كنت حساساً لأي طعام أو لأي دواء، عليك إبلاغ الطبيب عن ذلك قبل إستعمال الدواء.
- لا يجوز إستعمال اكنتريم قريبا من العين، في الأنف، في الفم أو في الأغشية المخاطية.
- أثناء العلاج باكنتريم من المستحسن الإمتناع عن إستعمال مواد مجففة للجلد.
- عليك ترك فاصل زمني قدره ساعة على الأقل بين إستعمال هذا الدواء وبين إستعمال أدوية أو مستحضرات تجميلية.
- عليك الإمتناع عن إستعمال اكنتريم على جلد مصاب (جروح، حروق من الشمس وما شابه).

⚠ إذا كنت تستعمل أو إذا إستعملت مؤخراً أدوية أخرى، بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو للصيدلي عن ذلك، خاصة إذا كنت تستعمل مضاد حيوي أو مستحضر آخر للعلاج الموضعي لحب الشباب (مثل:مستحضر يحتوي على كلينداميسين).

⚠ الحمل والإرضاع

إذا كنت في فترة الحمل، تخططين للحمل أو في فترة الرضاعة يجب إستشارة الطبيب قبل إستعمال الدواء.

⚠ التخزين

إمتنع عن العلاج باكنتريم بالقرب من لهب مكشوف أو أثناء التدخين.

⚠ معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

المركب پروپيلين جليكول الموجود في المحلول من شأنه أن يسبب تهيجاً في الجلد.

كذلك يحتوي المستحضر على الكحول، حيث أن ملامسته للعينين يمكن أن يسبب الحرقة. في حال دخول المستحضر للعينين، للثم أو لأمس جلداً مصاباً، يجب غسل المنطقة تحت تيار ماء جاري من الحنيفة.

٣) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب الإستعمال حسب تعليمات الطبيب دأشماً.

المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط. المقدار الدوائي الإعتيادي عادة هو:

للکبار والأطفال فوق عمر ١٢ سنة: بعد تنظيف الجلد، إدهن جيداً اكنتريم على كافة مناطق الجلد المصابة مرتين في اليوم؛ في الصباح وفي المساء؛ في حالات تطور جفاف مفرط في المناطق المعالجة يدرس الطبيب تقليل وتيرة العلاج إلى مرة في اليوم. يجب الدهن وفقاً لتعليمات الطبيب وإتمام كل العلاج الدوائي. من المستحسن الإمتناع عن غسل المناطق المصابة في أوقات متقاربة جداً وذلك لمنع جفاف الجلد وتفاقم الحالة.

لا تتجاوز المقدار الدوائي الموصى به.





PATIENT PACKAGE INSERT IN ACCORDANCE WITH THE PHARMACISTS' REGULATIONS (PREPARATIONS) - 1986

The medicine is dispensed with a doctor's prescription only

ACNETRIM

Solution

Active ingredient: Erythromycin 2%
Inactive ingredients in the preparation - see section 6 "Further Information".

Read this leaflet carefully in its entirety before using the medicine. This leaflet contains concise information about the medicine. If you have further questions, refer to the doctor or pharmacist.

This medicine has been prescribed to treat you. Do not pass it on to others. It may harm them even if it seems to you that their medical condition is similar.

This medicine is not intended for children and adolescents under 12 years of age.

1. WHAT IS THE MEDICINE INTENDED FOR?

Topical antibiotic treatment of acne, particularly inflammatory acne with papules and pustules.

Therapeutic group: Macrolide antibiotics.

2. BEFORE USING THE MEDICINE

Do not use the medicine:

- if you are sensitive (allergic) to the active ingredient or to any of the other ingredients which the medicine contains.
- in children under 12 years of age.

Before treatment with Acnetrim, tell the doctor if:

- you have a history of antibiotic-associated colitis (manifested by prolonged and severe or bloody diarrhea) or inflammatory bowel disease.
- you are pregnant, planning to become pregnant or are breastfeeding.

Special warnings regarding use of the medicine

- If you are sensitive to any food or medicine, inform the doctor before using the medicine.
- Do not use Acnetrim near the eyes, nose, mouth or on mucous membranes.
- During the course of treatment with Acnetrim, it is advisable to avoid using products that dry the skin.
- Separate application of this medicine with that of other cosmetic preparations or medicines, by at least one hour.
- Avoid using Acnetrim on damaged skin (cuts, sunburns and the like).

If you are using, or have recently used, other medicines, including non-prescription medicines and nutritional supplements, tell the doctor or pharmacist, particularly if you are using antibiotics or another topical preparation to treat acne (e.g., a preparation containing Clindamycin).

Pregnancy and breastfeeding

If you are pregnant, planning to become pregnant or are breastfeeding, consult a doctor before using the medicine.

Smoking

Avoid treatment with Acnetrim near an open fire or when smoking.

Important information regarding some of the ingredients of the medicine

Propylene glycol, an ingredient in the solution, can cause skin irritation. This preparation also contains alcohol, which, upon contact with the eyes, can cause burning. If this preparation enters the eyes, mouth or comes into contact with damaged skin, rinse the area under running tap water.

3. HOW SHOULD YOU USE THE MEDICINE?

Always use according to the doctor's instructions.

The dosage and treatment regimen will be determined by the doctor only. The usual dosage is generally:

For adults and children over 12 years of age: After cleaning the skin, fully cover all the affected skin areas with Acnetrim, twice a day: in the morning and evening. In cases where excessive dryness of the treated areas develops, the doctor will consider reducing the frequency of treatment to once a day. Apply according to the doctor's instructions and complete the full course of treatment. It is advisable to avoid washing the affected areas too often to prevent drying of the skin and worsening of the condition.

Do not exceed the recommended dose.

This medicine is not intended for children and adolescents under 12 years of age. Do not swallow! For external use only.

Opening instructions: To first open the bottle, firmly press on the center of the sponge with a clean finger.

Duration of treatment: If there is no improvement in your condition within one month, refer to the doctor.

If you took an overdose, or if a child accidentally swallowed the medicine, immediately refer to a doctor or proceed to a hospital emergency room and bring the package of the medicine with you.

If you forgot to apply this medicine at the designated time, do not apply a double dose. Continue applying the next dose at the usual time.

Adhere to the treatment regimen recommended by the doctor.

Do not take medicines in the dark! Check the label and the dose each time you take the medicine. Wear glasses if you need them.

If you have further questions regarding use of the medicine, consult the doctor or pharmacist.

4. SIDE EFFECTS

As with any medicine, use of Acnetrim may cause side effects in some users. Do not be alarmed when reading the list of side effects. You may not suffer from any of them.

Discontinue use and refer to a doctor immediately if the following effects develop:

- Local inflammation or rash (that were not present before use of the preparation).
- Signs of allergy, such as: swelling of the face, lips, eyelids or tongue, shortness of breath/difficulty breathing.
- Severe or prolonged diarrhea.

Additional side effects:

Very common side effects

- Burning, sensation of burning in the skin
- Skin irritation
- Dry skin, redness of the skin (especially at the beginning of treatment)
- Stinging at the application site.

Side effects of unknown frequency

- Diarrhea, abdominal discomfort or pain, itching.

If any of the side effects worsen or if you suffer from a side effect not mentioned in this leaflet, consult the doctor.

5. HOW SHOULD THE MEDICINE BE STORED?

- Avoid poisoning! This medicine and any other medicine must be kept in a safe place out of the reach of children and/or infants to avoid poisoning. Do not induce vomiting without explicit instruction from the doctor.
- Do not use the medicine after the expiry date (exp. date) that appears on the bottle or package. The expiry date refers to the last day of that month.
- Store in a cool place, below 25°C.
- Caution! Inflammable - keep away from fire and from direct sunlight!
- Close the bottle tightly to prevent evaporation of the substance.

6. FURTHER INFORMATION

- In addition to the active ingredient, the medicine also contains: Alcohol, propylene glycol, oleyl alcohol, perfume essence.
- What does the medicine look like and what are the contents of the package? Each package has a glass bottle that contains 25 ml of a clear solution.
- Manufacturer and registration holder: Trima, Israel Pharmaceutical Products Maabarot Ltd. Maabarot 4023000, Israel.
- This leaflet was checked and approved by the Ministry of Health in August 2014.
- Registration number of the medicine in the National Drug Registry of the Ministry of Health: 035.38.25621.00

هذا الدواء غير مخصص للأطفال وللمراهقين دون عمر ١٢ سنة. لا يجوز البلع! للاستعمال الخارجي فقط.

تعليمات الفتح: لفتح القنينة للمرة الأولى يجب الضغط بقوة بواسطة أصبع نظيفة على وسط الإسفنجة.

فترة العلاج: راجع الطبيب إذا لم يطرأ تحسن على حالتك الصحية خلال شهر.

إذا استعملت مقدار دوائي مفرط أو إذا بلع الطفل بالخطأ من الدواء، توجه حالاً للطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر عبوة الدواء معك.

إذا نسيت دهن هذا الدواء في الوقت المطلوب، فلا يجوز دهن مقدار دوائي مضاعف. إستمر في دهن المقدار الدوائي التالي كالمعتاد.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

لا يجوز إستعمال الأدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقادير الدوائية في كل مرة تستعمل فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

٤) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال أكثر من ٢٥ ملل محلول شفاف. لا تتدهش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أي منها.

يجب التوقف عن الإستعمال ومراجعة الطبيب حالاً إذا تطورت الأعراض التالية:

- طفح أو التهاب موضعي (لم يكونا قبل إستعمال المستحضر).
- علامات لحساسية مثل: إنتفاخ في الوجه، في الشفتين، في الجفنين أو في اللسان، ضيق/صعوبة في التنفس.
- إسهال شديد أو متواصل.

أعراض جانبية إضافية:

أعراض جانبية شائعة جداً

- حرقة، الشعور بحرقة في الجلد
- تهيج في الجلد
- جفاف في الجلد، احمرار في الجلد (خاصة في بداية العلاج)
- وخزات في مكان الدهن.

أعراض جانبية ذات شيوخ غير معروف

- إسهال، إنزعاج أو ألم في البطن، حكة.

إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

٥) كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم: يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنتقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر القنينة أو العبوة. يشير تاريخ الصلاحية الى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- يجب التخزين في مكان بارد، دون ٢٥ درجة مئوية.
- تحذير! مادة قابلة للإشتعال، أبعدها عن النار وعن أشعة الشمس المباشرة!
- يجب إغلاق القنينة بإحكام وذلك لمنع تبخر المادة.

٦) معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً:

Alcohol, propylene glycol, oleyl alcohol, perfume essence.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة؟

في كل عبوة يوجد قنينة زجاجية تحتوي على ٢٥ ملل محلول شفاف.

المنتج وصاحب الإمتياز: تريما، منتجات طبية إسرائيلية معبوت م.ض. معبوت ٤٠٢٣٠٠٠، إسرائيل.

أقرت وزارة الصحة صيغة هذه النشرة ومحتواها فحص ورخص في آب ٢٠١٤

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومية في وزارة الصحة: ٠٣٥٦٢١-٠٠-٣٨-٢٥

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكور. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

Maabarot 4023000
Israel Pharmaceutical Products
Maabarot Ltd.



107058010

معبوت ٤٠٢٣٠٠٠
منتجات طبية إسرائيلية
معبوت، م.ض.

