



תוצרי רפואה ישראליים, מעברות בע"מ, דואר מעברות 4023000  
ISRAEL PHARMACEUTICAL PRODUCTS, MAABAROT LTD., POST MAABAROT 4023000, ISRAEL

אוגוסט 2016

רופאה נכבד/ה,  
רוקח/ת נכבד/ה,

הנדון: עדכון בעלון לצרכן

## MINOXI 2

מרכיב פעיל: **MINOXIDIL 2%**

התוויה:

Androgenetic Alopecia In Females.

הרינו להודיעכם כי העלון לצרכן של התכשיר שבנדון עודכן ושוכתב.

מצייב העלון לצרכן המעודכן. יש לקרוא בעיון.

העלון מפורסם במלואו במאגר התרופות שבאתר האינטרנט של משרד הבריאות וניתן לקבלו מודפס ע"י פניה לבעל הרישום, חברת תרימה, תוצרי רפואה ישראליים מעברות בע"מ, קיבוץ מעברות 4023000, טלפון: 074-7141147.

בברכה,

תרימה, תוצרי רפואה ישראליים, מעברות בע"מ, דואר מעברות 4023000

<div><span><span></span></span></div>	<div><b>עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986</b></div>
התרופה משוקת ללא מרשם רופא	

## מינוקסי 2 תמיסה לקרקפת

**הרכב:** החומר הפעיל: מינוקסידיל 2% Minoxidil חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר - ראי בסעיף 6.

**קראי בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמשי בתרופה.** עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

**מינוקסי 2 מיועד לנשים בגילאי 65–18 שנים במקרים של התקררות מהסוג התורשתי בלבד.**

עליך להשתמש בצורה נכונה. היוועצי ברוקח אם הנך זקוקה למידע נוסף.

שימוש תכוף ו/או בכמות גדולה יותר לא יגביר את צמיחת השיער, עלול לגרום לתופעות לוואי מרובות יותר ואף עשוי לגרום לתופעות לוואי הקשורות בירידה בלחץ הדם, כגון: כאב בזהר, סחרחורת, עיפולן, קצב לב מהיר, התנפחות הפנים. במקרה ואחת מתופעות אלו מופיעה יש להפסיק שימוש ולפנות לרופא מיד. יש להתמיד בטיפול על פי ההוראות. אין להשתמש על אזורים אחרים מלבד הקרקפת.

**1. למה מיועדת התרופה?**

מינוקסי 2 מיועד להצמצם שיער הקרקפת אצל נשים בריאות בגילאי 18-65 במקרים של התקררות מהסוג התורשתי בלבד. יש להוועץ לרופא המטפל על מנת לוודא שסוג הנשירה שלך מתאים לטיפול בתכשיר זה.

**קבוצה תרופוטיית:** מרחיבי כלי דם.
במתן מקומי, לטיפול בנשירת שיער.

**2. לפני שימוש בתרופה**

**אין להשתמש בתרופה אם:**

- הנך בהריון או מניקה.
- גילך קטן מי- 18 שנים או גדול מ- 65 שנים.
- את רגישה (אלרגית) לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראי סעיף 6).
- הנשירה ממנה את סובלת אינה על רקע תורשתי.
- הסיבה לנשירה אינה ידועה, אם הנשירה היא בעקבות לידה או הנשירה פתאומית ולא צפויה.
- הנשירה גורמת על ידי טיפול תרופתי שאיט מקבלת.
- את קיורת לחלוטין או שכל שיער הגוף שלך נשר.
- את סובלת מיתר לחץ דם, גם אם אינו מטופל.
- את סובלת מבניון כלשהו המשפיעה על עור הקרקפת (כגון: כווית שמש, פסוריאזיס וכו').
- את מגלחת את הקרקפת שלך.
- את משתמשת בקרמים, משחות או תרציצים למיניהם שנועדו לטפל בבעיות קרקפת, כגון: דיטרומל (לטיפול בפסוריאזיס), טסטינואנין (לטיפול באקנה או בעיות עור נוספות), קורטיקוסטרואידים (חומרים אנטי דלקתיים, כגון: הידרוקורטיזון, בטאמתאזון), פרפריס (פטרולטום) - מרכיב נפוץ בקרמים לשיער.
- יש לך חבישה מכל סוג שאוה על הקרקפת.
- עור הקרקפת שלך פגוע או לא בריא.

**אהררת מייחזרת הנוגעות לשימוש בתרופה:**

אם יש להתייעץ עם הרופא שלך במידה והנך סובלת או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד הלב (לרבות הפרעות קצב, תעוקת זהה או כאבים בזהר/ או בעיות ברזימת הדם ו/או יתר לחץ דם), הכליה, מערכת הדם (כגון רגישה וכו').

יש לוודא טרם שימוש בתרופה שעור הקרקפת בריא ולא פגום.

יש להשתמש בתכשיר זה אך ורק על הקרקפת.

במידה ומינוקסי עובר לזרם הדם, יכולות להיגרם תופעות לוואי הנוגעות מלחץ או כאב נמוך כגון: כאבים בחזה, קצב לב מהיר, עיפולן, סחרחורת, נפיחות של הידיים וכפות הרגליים, אדמוניות שאינה חולפת או גירוי של הקרקפת. אם הנך חווה תופעת לוואי תורשית רשימה זו, הפסיקי את השימוש בתרופה ופני מיד לרופא. בעת שימוש בתכשיר על פי ההוראות, מאוד לא סביר שתופעות לוואי אלה יופיעו. הסיכון עולה במידה ונעשה שימוש בתכשיר על עור פגוע (כגון פסוריאזיס) או במיזון יתר.

אם הנך רגישה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי עלייך להודיע על כך לרופא לפני השימוש בתרופה.

יש להפסיק על שטיפת הידיים מיד לאחר השימוש בתכשיר. יש להימנע ממגע עם העיניים, עור פגוע ואזורים רגישים. במידה ונוצר מגע כזה, יש לטשוף עם הרבה מים.

**אם את לוקחת, או אם לקחת לתרופה, אחרות אחרות כולל תרופות לא מדרשם ותוספי תזונה, ספרי על כך לרופא או לרוקח.** במיוחד יש לידע את הרופא או הרוקח לגבי תרופות מהקבוצות הבאות:

- טיפול ביות לחץ דם (מרחיבי כלי דם כגון: הידראלאזין) - מחשש להגברת פעילותן.
- טיפול מינוקסי בקרקפת.

**הרייון הנקה:**

אין להשתמש בתכשיר אם הנך בהריון או מניקה.

**עישון:**

התכשיר דליק, לכן אין לעשן בקרבתו. אין להדליק סיגריה או להיחשף לאש על ליקוש מוחלט של התכשיר.

**ליידע חשבו על טיב הממרכיבים של התרופה:**

פרופילן גליקול המצוי בתמיסה עשוי לגרום לגירוי עור הקרקפת.

התכשיר מכיל גם אלוכוהל (אתאנול), שעשוי לגרום לצריבה וגירוי במגע עם העיניים. במידה והתכשיר נכנס לעיניים, לפה או באב במגע עם עור פגום, יש לטשוף את האזור תחת מי ברז וזורמים קרם.

**3. כיצד תשתמשי בתרופה?**

עליך בדיקוע עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוחה.

יש להשתמש בתכשיר אך ורק בשימוש מקומי וחיצוני, שירות על הקרקפת.

המינון המקובל בדרך כלל הוא לפי הוראות השימוש הבאות: הכמות המקסימלית לטיפול הינה 2 מ"ל ביום: 1 מ"ל בבוקר ו-1 מ"ל בערב (1 מ"ל = 7 טרנזום). יש לרווח לפחות 12 שעות בין שימוש אחד לשני.

שימוש תכוף ו/או בכמות גדולה יותר לא יגביר את צמיחת השיער אך עלול לגרום לתופעות לוואי מרובות יותר. לכן **יש להפסיק על מדידת המנה באמצעות מספר ההתזות המומלץ**.

תהליך צמיחת השיער, כמו תהליך ההתקררות ונשירת השיער, הינו ממושך, ולפיכך יש להשתמש בתכשיר לפחות 4 חודשים על מנת להעריך את צמיחת השיער מחדש. אם איך רואה שיפור לאחר מספר חודשים, יש לפנות לרופא המטפל.

**אין לעבור על המנה המומלצת.**

יש להשתמש בתכשיר על שיער וקרקפת יבשים לחלוטין. בכמות כוללת של 1 מ"ל על אזורי ההתקררות. אם ניתן, יש להתחיל במרחק הקרקרות ובאצבע נקה יש לפזר את החומר. לאחר המריחה יש לטשוף היטב את הידיים וכל אזור שבא במגע עם התמיסה.

יש להימנע מטפסוף מינוקסי 2 על הפנים או על אזורי עור שמחוץ לאזור ההתקררות. במידה ונשפר בטעות על אזור שאינו הקרקפת יש לטשוף היטב עם הרוב מים. יש להיזהר מלשאוף את התריסים בעת התזות על הקרקפת.

לאחר השימוש במוקסי 2: יש להימנע מחפיפת הראש במשך כשתיים. אין להשתמש במייבש שיער לזירוז ייבוש השיער מהתמיסה. אין להניח את הראש על הכר לפחות שעה אחרי מריחת הקרקפת. יש להימנע מחפישת השיער לשמש.

ניתן להשתמש במינוקסי 2 בשתי צורות התזה, בחרי בצורה שחכי מתאימה לך:

1.באמצעות המזח המקורי לטיפול בקרחות שאינן מכוסות בשיער כלל או באזורים נרחבים:

א. יש להסיר את מכסה הפלסטיק השקוף.

ב. להחזיק את הקבוקק בצורה אנכית, להתיז את התמיסה על האזור המטופל ולפזרה על כל האזור הרצוי בעזרת קצות האצבעות. כמות התמיסה הכוללת שיעשה בה שימוש (על כל אזורי ההתקררות יחד) היא 7 התזות לכל היתר.

2.באמצעות מתח מוארך (מצורף לאריזה) לטיפול בקרחות המכוסות חלקית בשיער או בשטח קטן:

א. יש להסיר את מכסה הפלסטיק השקוף.

ב. יש להסיר במשיכה את חלקו העליון של המזח (החלק בעל החריץ) ולהרכיב במקומו את המזח המוארך.

ג. להחזיק את הקבוקק בצורה אנכית, להתיז את התמיסה על האזור המטופל ולפזרה על כל האזור הרצוי בעזרת קצות האצבעות. כמות התמיסה הכוללת שיעשה בה שימוש (על כל אזורי ההתקררות יחד) היא 7 התזות לכל היתר.

יתכן והצמיחה הראשונית תראה רכה ופולומית אך בסופו של דבר השיער יצמח כשיער רגיל.

יש להמשיך את הטיפול גם לאחר שהשיער החל לצמוח מחדש.

יש להמשיך ולהשתמש פעמיים ביום על פי ההוראות.

אם אינך רואה שיפור בצמיחת השיער לאחר שנה של שימוש, יש להפסיק את הטיפול.

**אם שכחת למרוח את התרופה** בזמן הדרוש, המשיכי את הטיפול על פי ההוראות. יש לרווח לפחות 12 שעות בין שימוש אחד לשני. אין למרוח מנה כפולה.

**כיצד תוכלי לסייע להצלחת הטיפול?**

יש למרוח את התכשיר רק כאשר הקרקפת והשיער יבשים לגמרי. יש להמדיד בטיפול על פי הוראות. הפסקת הטיפול גורם קרוב לוודאי לנשירה של השיער שצמח וחיזשו תהליך הנשירה תוך 3-4 חודשים.

משתמשת צעירות ו/או שהתליך התקררותן החל לפני זמן לא רב ו/או שאזור ההתקררות אצלן אינו נרחב עשויות ליהנות מתוצאות טובות יותר. אם תהליך ההתקררות החל לפני שנים רבות ו/או שטח ההתקררות נרחב, סיכויי הצלחת הטיפול נמוכים.

**בדיקות ומעקב**

בתקופת הטיפול בתרופה זו יש לערוך בדיקות דם, שתן, תפקוד הכליות, הלב ומערכת הנשימה. יש להיות ערניים לגבי שינויים בהרגשה הכללית ובמצב הבריאותי. אם הנך רגישה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עלייך להודיע על כך לרופא לפני השימוש בתרופה. יש להישקל פעמיים בשבוע, במקרה של עליית משקל פתאומית יש לפנות מיד לרופא. חולים במחלות לב ו/או יתר לחץ דם, המטופלים בתרופה זו חייבים להיות בפקוח רפואי במשך כל תקופת הטיפול. אין להשתמש על קרקפת מודלקת, מגורה ו/או אדמומה בזמן טיפול בתכשיר אחר.

**שימי לב:** לא לבלוע, תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד על הקרקפת. יש להימנע משיאפית התריסים.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ליד או מבוזר מן התרופה, פני מיד להדר מיון של בית חולים והביאי אריזת התרופה איתך. בליעת התכשיר עלולה לגרום לבעיות קשות בתפקוד הלב. אין ליטול תרופות בחושן! בדקי התוויות והמנה בכל פעם שהנך נוטלת תרופה. הרכיבי משפיקים אם הנך זקוקה להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועצי ברופא או ברוקח.

**4. תופעות לוואי**

כמו בכל תרופה, השימוש במינוקסי 2 עלול לגרום לתופעות לוואי חבלק מהמשתמשים. אל תחבלי למרקא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבלי מאף אחת מהן.

**יש להפסיק את השימוש בתכשיר ולפנות מיד לרופא או למרכז רפואי אם מתפתחות אחת או יותר מהתופעות הבאות:**

- כאב בזהר.
- נפיחות בפנים, בשפתיים, בפה, בלשון או בגרון שיגורמו לקושי בליעיה ובנשימה.

**יש להפסיק את השימוש ולהתייעץ עם הרופא אם מתפתחות אחת או יותר מהתופעות הבאות:**

תגובות אלרגיות הכוללות אדמוניות או גירוי בעור או לחץ בגרון, לחץ דם נמוך, קצב לב מהיר, פלפיטציות (תחושת דפיקות לב מהירות וזחקות), עיפולן וסחרחורת. נפיחות בגפים, קוצר נשימה, עליה פתאומית של מוטסרבת במשקל, אדמוניות או גרד מקומי שאינם חולפים.

**תופעות לוואי נוספות:**

**תופעות לוואי להקאות מאוד:**

- כאב ראש.

**תופעות לוואי שכוחות:**

**גד, גרד, דלקת בעור (דרמטיטיס), צמיחת שיער מוגברת. תופעות לוואי לא שכוחות:**

גירוי של הקרקפת הכולל אדמוניות מקומית, יובש, עור קשקשי. תופעות אלה יכולות לנבוע מהמרכיב פרופילן גליקול הנמצא בתכשיר. תופעות אלה תן בדרך כלל זמניות. במידה והן אינן חולפות, יש להפסיק את השימוש בתכשיר. פריחה דמוית אקנה, פריחה מגרדת, שלפוחיות, דימום או כו.ב.

צמיחת שיער לא רצויה מחוץ לקרקפת (כולל דיווחים על צמיחת שיער באזור הפנים בנשים). יש להפסיק על שטיפת הידיים לאחר המריחה. במידה ושמת מהתמיסה באזור אחר בגוף שאינו הקרקפת, יש לטשוף מיד עם הרבה מים.

נשירת שיער זמנית עלולה לקרות במהלך 2-6 השבועות הראשונים לטיפול. הסיבה לכך היא כנראה השינוי במחזור הצמיחה של השיער. נשירה זו אמורה להיפסק תוך שבועיים. במידה והנשירה נמשכת יותר משבועיים, יש להפסיק את השימוש במינוקסי 2 ולהתייעץ עם הרופא.

שינוי בצבע או במרקם השיער. במידה וחל שינוי כזה, יש להפסיק את השימוש בתכשיר.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מהתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר את סובלת מתופעת לוואי שלא הוזכרה בעלון, עלייך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לזנוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי. עקב טיפול תרופתי שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: **https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il**

**5. איך לאחסן את התרופה?**

- מניע הרעלה/תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להגשי ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרמי להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date). המופיע על גבי האריזה/תווית. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- יש לשמור במקום קריר, בטמפרטורה נמוכה מ- 25°C.
- המוצר דליק. יש להרחיק ממקור אש ו/או חום. אין להדליק סיגריה או להיחשף לאש עד לייבוש מוחלט של התכשיר.

**6. מידע נוסף**

נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם: Propylene glycol, alcohol 95%, purified water, dexpantenol.

**כיצד רגאית התרופה ומה תוכן הרקזה?**

- האריזה מכילה בקבוק ספריי המכיל 80 מ"ל תמיסה וכן מתח מוארך.
- יצרן ובעל הישום: תרימה, תוצרי רפואה ישראליים מעברות בע"מ, מעברות 4023000, ישראל.
- עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות בתאריך: יולי 2016.
- מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 216155.049.97.

<div><span><span></span></span></div>	<div><b>מעברות 4023000</b></div>
<div><b>תוצרי רפואה ישראליים</b></div>	<div><b>מעברות בע"מ</b></div>

107408010

נشرة למستهלק بموجب أنظمة الصلدة

(مستحضرات) - ١٩٨٦

يسوق الدواء بدون وصفة طبيب

## מינוקסי 2

## מחلول لفروة الرأس

التريكب: المادة الفعالة: مينوكسيديل 2% Minoxidil

المواد غير الفعالة ومولدات الحساسية في المستحضر – انظر الفقرة ٦

**إقرئي النشرة وتعمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء.** تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفر لديك أسئلة إضافية، راجعي الطبيب أو الصيدلي.

**مينوكسي ٢ مخصص للنساء بعامار ١٨-٦٥ سنة وذلك في حالات الصلغ من النوع الوراثي فقط.**

عليك إستعماله على الشكل الصحيح. إستشيري الصيدلي إذا كنت بحاجة لمعلومات إضافية.

إن الإستعمال المتكرر و/أو بكمية أكبر لا يزيد نمو الشعر، فقد يسبب أعراضاً جانبية أكثر لآ بل من شأنه أن يسبب أعراضاً جانبية متعلقة بإنخفاض ضغط الدم، مثل: ألم في الصدر، دوام، إغماء، نظم قلب سريع، إنتفاخ الأطراف. في حال ظهور إحدى تلك الأعراض يجب التوقف عن الإستعمال ومراجعة الطبيب حالا.

يجب الوافطة على العلاج حسب التعليمات. لا يجوز الإستعمال على مناطق أخرى عدا عن فروة الرأس.

**١) لأي غرض مخصص الدواء؟**

مينوكسي ٢ مخصص لإنبات شعر فروة الرأس لدى نساء أصحاء بعامار ١٨–٦٥ سنة في حالات الصلغ من النوع الوراثي فقط. يجب إستشارة الطبيب المعالج من أجل التأكد أن نوع تساقط الشعر لديك مناسب للعلاج بهذا المستحضر.

**الفصليلة العلاجية:** موسع للأوعية الدموية. للإستعمال الموضعي، لمعالجة تساقط الشعر.

**٢) قبل إستعمال الدواء**

**❗ لا يجوز إستعمال الدواء إذا:**

- كنت في فترة الحمل أو الرضاعة.
- كان عمرك أقل من ١٨ سنة أو أكثر من ٦٥ سنة.
- كنت حساسة (لديك البريجيا) للمادة الفعالة أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (انظري الفقرة ٦).
- كان تساقط الشعر الذي تعانيين منه ليس على خلفية وراثية.
- كان سبب تساقط الشعر غير معروف. إذا كان التساقط جراء ولادة أو إذا كان تساقط الشعر بشكل مفاجئ وغير متوقع.
- كان تساقط الشعر ناتج عن تلفك لعلاج دوائي.
- كنت صلعاء تماماً أو أن كل شعر جسك قد سقط.
- كنت تعانيين من إرتفاع ضغط الدم، حتى ولو لم يكن مجالياً.
- كنت تعانيين من أية مشكلة تؤثر على جلد فروة الرأس (مثل: حروق الشمس، الصدفية والحب).
- كنت تحلقين فروة رأسك.
- كنت تستعملين كريمات، مراهم أو غسولات بشتی أنواعها المخصصة لمعالجة مشاكل فروة الرأس. مثل: بيترانول (المعالجة الصدفية)، تربيتونين (لعلاج حب الشباب وإحتيا جلدية إضافية)، كورتيكوستيروئيدات (مواد مضادة للإلتهاپ، مثل: هيدروكورتيزون، بيثاميتازون)، پارافين (بيترولاتوم) – مركب شائع بكريمات الشعر.
- لديك تضاد من أي نوع كان على فروة الرأس.
- كان جلد فروة رأسك متضرراً أو غير معافى.

**تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء:**

• يجب إستشارة طبيبك إذا كنت تعانيين أو عانيت في الماضي من خلل في الأداء الوظيفي للقلب (بما في ذلك اضطرابات النظم، نبضة صدرية أو آلام في الصدر و/أو مشاكل في جريان الدم و/أو إرتفاع ضغط الدم)، الكلىة، جهاز الدم (مثل النحز والحب).

• يجب التأكد قبل إستعمال الدواء من أن جلد فروة الرأس معافى وغير متضرر.

• يجب إستعمال هذا المستحضر فقط على فروة الرأس.

• إذا إنتقل مينوكسي إلى مجرى الدم، فمن الممكن أن تحدث أعراض جانبية سببها إنخفاض ضغط الدم مثل: آلام في الصدر، تسرع نظم القلب، إغماء، دوام، إنتفاخ اللبدين وإحتيا الفقمين، إحصار غير زائل أو تبيح فروة الرأس.إذا قاسيت من عرض جانبي من هذه القائمة، توقيني عن إستعمال الدواء وراجعي الطبيب حالا. عند إستعمال المستحضر وفقاً للتعليمات، من غير المحتمل جداً أن تظهر هذه الأعراض الجانبية. تزداد الخطورة إذا تم إستعمال المستحضر على جلد متضرر (مثل الصدفية) أو بمقدار دوائي مفرط.

• إذا كنت حساسة لأي طعام أو لأي دواء فعليك إبلاغ الطبيب عن ذلك قبل إستعمال الدواء.

• يجب الحرض على غسل اللبدين حالاً بعد إستعمال المستحضر. يجب تجنب التماس مع العينين، الفم، جلد متضرر ومناطق حساسة. في حال حدوث مثل هذا التماس، يجب الغسل بإستعمال الكثير من الماء.

❗ **إذا كنت تتناولين، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إبحكي لطبيب أو الصيدلي عن ذلك.** يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي بالأصح بالنسبة لأدوية من المجموعات التالية:

- لعلاج إرتفاع ضغط الدم (موسعات الأوعية الدموية مثل: هيدرالازين) – خشية زيادة تأثيرها.
- لعلاج موضعي بقفوة الرأس.

❗ **الحمل والإرضاع:**

لا يجوز إستعمال المستحضر إذا كنت في فترة الحمل أو الرضاعة.

❗ **التدخين:**

المستحضر قابل للإشتعال، لذا لا يجوز التدخين بالقرب منه. لا يجوز إشعال سيجارة أو التبغزر للرائ حتى الجفاف الكامل للمستحضر.

❗ **معلومات هامة عن مركات الدواء:**

من شأن بروبيلين جليكول الموجود في المحلول أن يسبب تهيج جلد فروة الرأس.

يحتوي المستحضر أيضاً على الكحول (إيتانول)، الذي من شأنه إذا لاسم العينين أن يسبب حرقة وتهيج. في حال دخول المستحضر للعينين، للغم أو لاسم جلد متضرر، يجب غسل المنطقة تحت تيار متدفق لماء بارد من الحنفية.

**٣) كيفية إستعمال الدواء؟**

عليك الإستيضاح من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكوني واثقة. يجب إستعمال المستحضر فقط للإستعمال الموضعي والخارجي، مباشرة على فروة الرأس.

المقدار الدوائي الإعتيادي هو عادة بحسب تعليمات الإستعمال التالية:

الكمية العظمى للعلاج هي ٢ ملل في اليوم، ١ ملل في الصباح و ١ ملل في المساء (١ ملل = ٧ بخات). يجب ترك فاصل زمني قدره ١٢ ساعة على الأقل بين إستعمال وآخر. إن الإستعمال المتكرر و/أو بكمية أكبر لا يزيد نمو الشعر ولكنه قد يسبب أعراضاً جانبية أكثر. لذا يجب الحرض على قياس **المقدار الدوائي بواسطة أحد البخات الموصى به.**

إن مسيرة نمو الشعر، عبالمشابه لمسيرة الصلغ وتساقط الشعر، هي مسيرة طويلة، ولذلك يجب إستعمال المستحضر لمدة ٤ أشهر على الأقل من أجل تقييم نمو الشعر مجدداً. إذا لم تلاحظي تحسن بعد عدة أشهر، يجب مراجعة الطبيب المعالج.

**لا يجوز نتجاوز المقدار الدوائي الموصى به.**

يجب إستعمال المستحضر على شعر وفروة رأس جافين تماماً. بكمية إجمالية ذات ١ ملل على كامل مناطق الصلغ. إذا أمكن، يجب البدء بمركز الصلغ ويجب توزيع المادة بأصبع نظيف. بعد الدهن يجب غسل اللبدين جيداً وأي منطقة كانت على تماس مع المحلول.

يجب الإمتناع عن تقطيع مينوكسي ٢ على الوجه أو على مناطق جلدية خارج منطقة الصلغ. إذا سكب بالخطأ على منطقة غير فروة الرأس فيجب غسلها جيداً مع الكثير من الماء. يجب توشي الحذر من استنشاق الرذاذ عند رشه على فروة الرأس.

بعد إستعمال مينوكسي ٢: يجب الإمتناع عن شطف الرأس لمدة ساعتين تقريباً. لا يجوز إستعمال مجفف الشعر لتسريع تجفيف الشعر من المحلول. لا يجوز وضع الرأس على وسادة على الأقل ساعت بعد دهن فروة الرأس. يجب الإمتناع عن تعريض الشعر للشمس.

بالإمكان إستعمال مينوكسي ٢ للحبج بطريقتين، إحتياري الطريقة الأكثر ملاءمة لك:

١) بواسطة البخاخ الأصلي لعلاج الصلغات الخالية تماماً من الشعر أو لمناطق

واسعة:

أ) يجب نزع الغطاء البلاستيكي الشفاف.

