

מאי 2013

רופאה נכבד/ה,
רוקח/ת נכבד/ה,

חברת תרימה שמחה להודיעך על תחילת שיווקו של התכשיר החדש:

Staphiderm Cream סטאפידרם קרם

מרכיב פעיל: Fusidic Acid 2%

התכשיר מיועד להתוויה:

Local treatment of skin infections due to sensitive strains of Staphylococcus Aureus

העלון לצרכן מצורף להודעה זו וכן נשלח לפרסום במאגר התרופות שבאתר האינטרנט של משרד הבריאות. ניתן לקבל את העלון מודפס ע"י פניה לבעל הרישום, חברת תרימה, תוצרי רפואה ישראליים מעברות בע"מ, קיבוץ מעברות 4023000, טלפון: 074-7141147.

בברכה



אילנה שוויגמן לוי
רוקחת ממונה
תרימה, תוצרי רפואה ישראליים מעברות בע"מ

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986
התרופה משוקקת על פי מרשם רופא בלבד

סטאפידרם קרם

החומר הפעיל וריכוזו: Fusidic Acid 2%
חומרים בלתי פעילים: ראה סעיף 6 "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.

עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה, אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

התרופה זו נרשמה עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

סטאפידרם קרם הינו תכשיר אנטיביוטי לטיפול מקומי, המיועד לטיפול בזיהומי עור חיידקיים הרגישים לתכשיר.

עלך להבחין בשיפור לאחר מספר ימי שימוש בסטאפידרם. אם לא חל שיפור לאחר שבעה ימים, יש להפסיק השימוש בתכשיר ולפנות לרופא. משך השימוש בתכשיר הוא בדרך-כלל עד שבועיים, יש להיוועץ ברופא בנוגע לשימוש לתקופה ממושכת יותר, שכן שימוש בקרם לתקופה ממושכת או בכמויות גדולות, עלול לגרום לעמידות של החיידקים לטיפול, להגברת הסיכון להחמרה של תופעות הלוואי, וכן להגברת הרגישות של העור לתרופה. במידה והרופא הורה לך להשתמש בסטאפידרם על עור הפנים, יש להימנע ממגע בעיניים.

1. למה מיועדת התרופה?

סטאפידרם קרם הינו תכשיר אנטיביוטי לטיפול מקומי, המיועד לטיפול בזיהומי עור חיידקיים הרגישים לתכשיר.

2. לפני שימוש בתרופה

⚠ אין להשתמש בתכשיר אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6).

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

- אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול אם** הינך בהיריון, חושדת שהינך בהיריון או מיניקה.
- אם הנך רגיש למוזן כלשהו או לתרופה כלשהי, במיוחד לחומרים אנטיביוטיים, עלך להודיע על כך לרופא לפני השימוש בתרופה.
- ⚠ אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.** במיוחד יש לידוע את הרופא או הרוקח אם אתה משתמש בתכשירים אחרים/שימוש חיצוני.

⚠ היריון והנקה:

אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול אם הינך בהיריון, חושדת שהינך בהיריון או מיניקה.

⚠ נהיגה ושימוש במכונית:

תרופה זו אינה משפיעה בדרך-כלל על יכולת הנהיגה או הפעלת מכונית. עם זאת, אם הנך חש בתופעת לוואי שעלולה לפגום בכושר הנהיגה או הפעלת מכונית, היוועץ ברופא.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

תמיד יש להשתמש לפי הוראות הרופא.

- אם אינך בטוח באשר לאופן השימוש עלך להתייעץ עם הרופא או הרוקח.
- מינון ואופן הטיפול ייקבעו על ידי הרופא בלבד.
- בהעדר הוראה אחרת מהרופא:
- יש לנקות את האזור המטופל לפני השימוש. בידיים נקיות יש לעסות את הקרם לתוך המקום הנגוע 3-4 פעמים ביום לתקופה שלא עלולה על שבועיים. יש לשתוף ידיים לאחר השימוש (אלא אם האזור המטופל הוא הידיים).
- במידה והרופא הנחה לחשוב את המקום הנגוע, תדירות השימוש היומי תהיה נמוכה יותר.
- עלך להבחין בשיפור לאחר מספר ימי שימוש בסטאפידרם. אם לא חל שיפור לאחר שבעה ימים, יש להפסיק השימוש בתכשיר ולפנות לרופא. משך השימוש בתכשיר הוא בדרך-כלל עד שבועיים, יש להיוועץ ברופא בנוגע לשימוש לתקופה ממושכת יותר. שימוש ממושך עלול ליצור עמידות חיידקים לתכשיר.
- במידה והרופא הורה לך להשתמש בסטאפידרם על עור הפנים, יש להימנע ממגע בעיניים. אם בטעות נגע התכשיר במוקד עיניים, יש לשתוף מיד עם מים קרים ולאחר מכן, במידה וניתן, יש לשתוף עם תמיסה לשיטפת עיניים. ייתכן והעין תצרוב. במידה ואתה חש כאב או בעיה בראייה פנה לרופא מיד.
- אין לעבור על המנה המומלצת.

- אין לבלוע! תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

אם שכחת למרוח תרופה זו בזמן הקצוב, מרח מיד כשמזכרת ולאחר מכן המשך השימוש בזמן הקצוב הרגיל.

כיצד תוכל לסייע להצלחת הטיפול?

- יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.
- גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא או הרוקח.
- אם לא חל שיפור במצבך תוך שבוע ימים יש לפנות לרופא שנית.
- אין לטול תרופות בחושי! בדיקת התונית והמנה **בכל פעם** שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.
- אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי:

כמו לכל תרופה, השימוש בסטאפידרם עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

קשי להפסיק את הטיפול בתרופה ולפנות מיד לרופא אם מתפתחת תגובה אלרגית שתסמיניה: קושי בנשימה, עקצוץ או נפיחות בשפתים ובפה, בפנים או בגרון, פריחה חמורה בעור.

תופעות לוואי נוספות:

- תופעות לוואי המופיעות לעיתים קרובות הינן** תגובות עוריות, בעיקר באזור מריחת הקרם:
- פריחה
- גרד

- דלקת עור ממגע (פריחה אדומה ומגרדת בעור המלווה בתחושת חום ונפיחות באזור בו נעשה שימוש בקרם)

- תחושת כאב

- עקצוץ, צריבה ו/או אדמומיות באזור בו נעשה שימוש בתכשיר

תופעות לוואי המופיעות לעיתים רחוקות:

- עיניים מגרדות או דומעות

- דלקת הלחמית (conjunctivitis)

תופעות לוואי ששכיחותן אינה ידועה:

- אקזמה

- אדמומיות בעור

- חרלת (אורטיקריה)

- נפיחות של העפעפיים או חלקים אחרים בגוף.

אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או אם אתה סובל מתופעת לוואי שלא הוזכרה בעלון, עלך להתייעץ עם הרופא.

5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- אחסן בטמפרטורה הנמוכה מ- 25°C.

6. מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם חומרים בלתי פעילים:

Liquid paraffin, cetostearyl alcohol, white soft paraffin, macrogol cetostearyl ether, sodium dihydrogen - phosphate dihydrate, chlorocresol, sodium hydroxide, purified water.

• כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה?

האריזה מכילה שפופרת של 15 גר/30 גר קרם בצבע לבן-שמנת.

• אתרי יצור: בן שמעון פלוריש בע"מ, פארק תעשייה משגב 20174 עבוד

יצרן ובעל רישום: תרימה, תוצרי רפואה ישראלים מעברות בע"מ, מעברות 4023000.

עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות בתאריך: דצמבר 2012

מס' רישום התרופה בפקטס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 148.97.33238.00
לשם הפטנט ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לשני המינים.

12124

מעברות בע"מ

תוצרי רפואה ישראלים

מעברות בע"מ

נشرة למستهלק بموجب أنظمة الصيدلة

(مستحضرات) - 1986

يسوق الدواء حسب وصفة طبيب فقط

ستافيدرم كريم

المادة الفعالة وتركيزها: Fusidic Acid 2%

المواد غير الفعالة: انظر فقرة ٦ « معلومات إضافية»

إقرأ النشرة بامعان حتى نهايتها قبل إستعمال الدواء.

تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي وصف هذا الدواء من أجله. لا تعطيه للأطفال. فهو قد يؤذيهم حتى ولو بدلك أن حالتهم الطبية مشابهة.

ستافيدرم كريم هو مستحضر مضاد حيوي للعلاج الموضعي، ومخصص لعلاج تلوذات الجلد الجرثومية الحساسة للمستحضر.

عليك ملاحظة حصول تحسن بعد عدة أيام من إستعمال ستافيدرم. إذا لم يحصل تحسن بعد سبعة أيام، يجب التوقف عن إستعمال المستحضر ومراجعة الطبيب. فترة إستعمال هذا المستحضر تكون عادة حتى إسبوعين، يجب إستشارة الطبيب بخصوص إستعمال الدواء لفترة أطول. لأن إستعمال الكريم لفترة طويلة أو بكميات كبيرة، يمكن أن يسبب مقاومة الجراثيم للعلاج. كذلك زيادة الخطورة لتفاقم الأعراض الجانبية، وزيادة حساسية الجلد للدواء. إذا أشار لك الطبيب بإستعمال ستافيدرم على جلد الوجه، يجب الإمتناع عن تماس الدواء بالعينين.

١) لأي غرض مخصص الدواء؟

ستافيدرم كريم هو مستحضر مضاد حيوي للعلاج الموضعي، ومخصص لعلاج تلوذات الجلد الجرثومية الحساسة للمستحضر.

٢) قبل إستعمال الدواء

⚠ لا يجوز إستعمال المستحضر إذا:

- كنت حساساً (اليرجي) للمادة الفعالة أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء. (انظر الفقرة ٦).

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء:

- لا يجوز إستعمال الدواء دون إستشارة الطبيب مقدماً إذا كنت في فترة الحمل، تظنين بأنك حامل أو إذا كنت مرضعة.
- إذا كنت حساساً لأي طعام أو دواء، خاصة لمضادات حيوية، عليك إبلاغ الطبيب عن ذلك قبل إستعمال الدواء.
- ⚠ إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، احكي للطبيب أو الصيدلي عن ذلك. يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي خاصة إذا كنت تستعمل مستحضر/ات آخر/ أخرى للإستعمال الخارجي.

⚠ الحمل والإرضاع:

لا يجوز إستعمال الدواء دون إستشارة الطبيب قبل بدء العلاج إذا كنت في فترة الحمل، تظنين بأنك حامل أو إذا كنت مرضعة.

⚠ السياقة وإستعمال الماكينات:

هذا الدواء لا يؤثر عادة على القدرة على السياقة أو تشغيل مآكناات. مع هذا، إذا كنت تشعر بأعراض جانبية يمكن أن تخل بالقدرة على السياقة أو تشغيل مآكناات، عليك إستشارة الطبيب.

٣) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب الإستعمال حسب تعليمات الطبيب دائماً.

عليك إستشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً من طريقة الإستعمال.

المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

في حال عدم وجود تعليمات أخرى من الطبيب:

يجب تنظيف المنطقة المعالجة قبل الإستعمال. يجب تدليك الكريم بيديّن نظيفتين داخل المكان المصاب ٢-٤ مرات في اليوم لفترة لا تزيد عن إسبوعين. يجب شطف اليدين بعد الإستعمال (إلا إذا كان المكان المعالج هو اليدين).

- إذا أوصى الطبيب بتضميد المكان المصاب، فإن وتيرة الإستعمال اليومي تكون أقل.
- عليك ملاحظة حصول تحسن بعد عدة أيام من إستعمال ستافيدرم. إذا لم يحصل تحسن بعد سبعة أيام، يجب التوقف عن إستعمال المستحضر ومراجعة الطبيب. فترة إستعمال هذا المستحضر تكون عادة حتى إسبوعين. يجب إستشارة الطبيب بخصوص إستعمال الدواء لفترة أطول. الإستعمال المتواصل يمكن أن يولد مقاومة الجراثيم للمستحضر.
- ⚠ إذا أشار لك الطبيب بإستعمال ستافيدرم على جلد الوجه، يجب الإمتناع عن تماس الدواء بالعينين. إذا لامس المستحضر العينين بالخطأ، يجب شطفهما حالاً بالماء البارد وبعد ذلك، إذا أمكن، يجب شطفهما بمحلول لإشطف العينين. من الجائز أن تحصل حرقة في العين. إذا كنت تشعر بالآه أو مشكلة في الرؤية راجع الطبيب حالاً.
- ⚠ تتجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها.
- ⚠ لا يجوز البلع! هذا الدواء مخصص للإستعمال الخارجي فقط.



106358110



**PATIENT PACKAGE INSERT IN ACCORDANCE WITH
THE PHARMACISTS' REGULATIONS (PREPARATIONS) - 1986**

The medicine is dispensed with a doctor's prescription only

STAPHIDERM CREAM

The active ingredient and its concentration: Fusidic Acid 2%
Inactive ingredients: see section 6 "Further information".

Read the package insert carefully in its entirety before using the medicine.

This leaflet contains concise information about the medicine. If you have further questions, refer to the doctor or pharmacist.

This medicine has been prescribed for you. Do not pass it on to others. It may harm them, even if it seems that their medical condition is similar.

Staphiderm Cream is an antibiotic preparation for local treatment, intended for the treatment of bacterial skin infections susceptible to the preparation.

You should notice an improvement after a few days of using Staphiderm. If there is no improvement after seven days, stop using the preparation and refer to the doctor. The duration of use of the preparation is usually up to two weeks; consult the doctor with regard to use for a longer period, as use of the cream for a prolonged period or in large quantities, may cause resistance of the bacteria to the treatment, to increased risk of side effects worsening and also to increased skin sensitivity to the medicine.

If the doctor told you to use Staphiderm on facial skin, avoid contact with the eyes.

1. WHAT IS THE MEDICINE INTENDED FOR?

Staphiderm Cream is an antibiotic preparation for local treatment, intended for the treatment of bacterial skin infections susceptible to the preparation.

2. BEFORE USING THE MEDICINE

Do not use the preparation if:

- you are sensitive (allergic) to the active ingredient or to any of the other ingredients contained in the medicine (see section 6).

Special warnings regarding use of this medicine:

- **Do not use the medicine without consulting the doctor before starting treatment** if you are pregnant, suspect you are pregnant or are breastfeeding.
- If you are sensitive to any food or medicine, especially to antibiotic agents, inform the doctor before using the medicine.

If you are taking, or have recently taken, other medicines, including non-prescription medicines and nutritional supplements, tell the doctor or pharmacist. It is particularly important to inform the doctor or pharmacist if you are using other preparation(s) for external use.

Pregnancy and breastfeeding:

Do not use the medicine without consulting the doctor before starting treatment if you are pregnant, suspect you are pregnant or are breastfeeding.

Driving and use of machines:

This medicine does not usually affect the ability to drive or operate machines. Nevertheless, if you experience a side effect that may impair your ability to drive or operate machines, consult the doctor.

3. HOW SHOULD YOU USE THE MEDICINE?

Always use according to the doctor's instructions.

If you are unsure about how to use it, consult the doctor or pharmacist.

- The dosage and treatment regimen will be determined by the doctor only. **Unless instructed otherwise by the doctor:**
- Clean the treated area before use. With clean hands, rub the cream into the affected area 3-4 times a day for a period that does not exceed two weeks. Wash your hands after use (unless the treated area is the hands).
- If the doctor has instructed you to bandage the affected area, the frequency of daily use will be lower.
- You should notice an improvement after a few days of using Staphiderm. If there is no improvement after seven days, stop using the preparation and refer to the doctor. The duration of use of the preparation is usually up to two weeks; consult the doctor regarding use for a longer period. Prolonged use may cause bacterial resistance to the preparation.
- If the doctor has instructed you to use Staphiderm on facial skin, avoid contact with the eyes. If the preparation accidentally came into contact with the eyes, wash immediately with cold water and then, if possible, wash with an eye rinse solution. The eye may burn. If you experience pain or a vision disturbance, refer to the doctor immediately.
- Do not exceed the recommended dose.
- Do not swallow! This medicine is intended for external use only.

If you take an overdose or if a child accidentally swallowed the medicine, refer immediately to the doctor or proceed to a hospital emergency room and bring the package of the medicine with you.

If you forgot to apply this medicine at the specified time, apply it as soon as you remember and after that, continue using at the usual specified time.

How can you contribute to the success of the treatment?

- Follow the treatment as recommended by the doctor.
- Even if there is an improvement in your health, do not stop treatment with the medicine without consulting the doctor or pharmacist.
- If there is no improvement in your condition within one week, refer to the doctor again.
- Do not take medicines in the dark! Check the label and the dose **each time** you take a medicine. Wear glasses if you need them.
- If you have further questions regarding use of the medicine, consult the doctor or pharmacist.

4. SIDE EFFECTS:

As with all medicines, use of Staphiderm may cause side effects in some users. Do not be alarmed when reading the list of side effects. You may not experience any of them.

Stop treatment with the medicine and refer to the doctor immediately if an allergic reaction develops, whose symptoms are: breathing difficulty, tingling or swelling of the lips and mouth, face or throat, severe skin rash.

Additional side effects:

- **Side effects that occur frequently** are skin reactions, primarily at the cream application site:
 - Rash
 - Itching
 - Contact dermatitis (a red and itchy rash on the skin accompanied by a sensation of heat and swelling in the area where the cream was used)
 - Sensation of pain
 - Tingling, burning and/or redness in the area where the preparation was used
- **Side effects that occur infrequently:**
 - Itchy or tearing eyes
 - Conjunctivitis
- **Side effects of unknown frequency:**
 - Eczema
 - Redness of the skin
 - Hives (urticaria)
 - Swelling of the eyelids or other parts of the body.

If any of the side effects worsens or if you experience a side effect not mentioned in the leaflet, consult the doctor.

5. HOW SHOULD THE MEDICINE BE STORED?

- Avoid poisoning! This medicine and all other medicines should be stored in a safe place out of the reach of children and/or infants in order to prevent poisoning. Do not induce vomiting without explicit instruction from a doctor.
- Do not use the medicine after the expiry date (exp. date) appearing on the package. The expiry date refers to the last day of that month.
- Store at a temperature below 25°C.

6. FURTHER INFORMATION

- In addition to the active ingredient, the medicine also contains inactive ingredients: Liquid paraffin, cetostearyl alcohol, white soft paraffin, macrogol cetostearyl ether, sodium dihydrogen - phosphate dihydrate, chlorocresol, sodium hydroxide, purified water.
- **What does the medicine look like and what are the contents of the package?** The package contains a tube of 15 g/30 g of a white-cream colored cream.
- **Manufacturer and License holder:** Trima, Israel Pharmaceutical Products Maabarot Ltd., Maabarot 4023000.

This leaflet was checked and approved by the Ministry of Health in December 2012
The registration number of the medicine in the National Drug Registry of the Ministry of Health: 148.97.33238.00

Maabarot 4023000
Israel Pharmaceutical Products
Maabarot Ltd.

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا بلغ طفلك من الدواء بالخطأ، عليك التوجه حالاً إلى الطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى مصطحباً عبوة الدواء.

إذا نسيت دهن هذا الدواء في الوقت المحدد، يجب دهنه حال تذكرك وبعد ذلك استمر بإستعمال الدواء في الزمن المحدد الإعتيادي.

كيف يمكن أن تساعد على إنجاح العلاج؟

- يجب المواظبة على العلاج حسب توصيات الطبيب.
- لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء دون إستشارة الطبيب أو الصيدلي حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية.
- إذا لم يطرأ تحسن على حالتك خلال أسبوع يجب مراجعة الطبيب ثانية.
- لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب فحص طابع الدواء والتأكد من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع نظارات طبية إذا لزم الأمر ذلك.
- إذا توفرت لديك أسئلة إضافية بخصوص إستعمال الدواء، يجب إستشارة الطبيب أو الصيدلي.

٤) الأعراض الجانبية:

كما بكل دواء، فإن إستعمال ستافيدرم يمكن أن يسبب أعراض جانبية لدى قسم من المستعملين. لا تندمش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أيًا منها.

يجب التوقف عن العلاج بالدواء ومراجعة الطبيب حالاً إذا تطور رد فعل تحسسي أعراضه:

صعوبات في التنفس، وخز أو انتفاخ في الشفتين والغم، في الوجه أو الحنجرة، طفح شديد في الجلد.

أعراض جانبية تظهر في أحيان متقاربة هي ردود فعل جلدية، خاصة في منطقة دهن الكريم:

- طفح
- حكة
- التهاب الجلد نتيجة للمس (طفح أحمر حاك في الجلد يترافق بالشعور بسخونة وانتفاخ في منطقة دهن الكريم)
- الشعور بالحم
- وخز، حرقة و/ أو احمرار في منطقة دهن المستحضر
- **أعراض جانبية تظهر في أحيان متباعدة:**
- حكة أو تدمع العينين
- التهاب ملتحمه العين (conjunctivitis)
- **أعراض جانبية ذات شيوع غير معروف:**
- إكزما
- إحمرار الجلد
- شرى
- انتفاخ الجفنين أو أجزاء أخرى في الجسم.

إذا تفاقت إحدى الأعراض الجانبية، أو إذا كنت تعاني من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، يجب إستشارة الطبيب.

٥) كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العبوة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- يجب التخزين بدرجة تقل عن ٢٥ درجة مئوية.

٦) معلومات إضافية:

يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً مواد غير فعالة:

Liquid paraffin, cetostearyl alcohol, white soft paraffin, macrogol cetostearyl ether, sodium dihydrogen - phosphate dihydrate, chlorocresol, sodium hydroxide, purified water.

• كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة؟

يحتوي العبوة على أنبوبة ذات ١٥ غرام / ٣٠ غرام كريم بلون أبيض - زبدى.

• **مكان الإنتاج:** بن شمعون فلوريش م.ض، يارك الصناعة مسجاف ٢٠١٧٤ من أجل

المنتج وصاحب الإمتياز: تريما، منتجات طبية إسرائيلية معبروت م.ض، معبروت ٤٠٢٣٠٠٠

أقرت وزارة الصحة صيغة هذه النشرة ومحتواها فحص ورخص في تاريخ: كانون الأول ٢٠١٢

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: ١٤٨ ٩٧ ٣٣٢٣٨ ٠٠

من أجل سهولة وتبويب القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكور. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

معبروت ٤٠٢٣٠٠٠
منتجات طبية إسرائيلية
معبروت، م.ض.