

**רופא/ה, רוקח/ת נכבד/ה**  
**חברת NCH מודיעה שמשרד הבריאות אישר את העדכונים הבאים בעלון של התכשיר:**  
**Lamisil Cream למיסיל קרם**  
**Terbinafine HCL 1%**

**עדכונים בעלון לצרכן**

**התויה כפי שאושרה בתעודת הרישום:**

Fungal infections of the skin caused by dermatophytes such as trichophyton (e.g. T. rubrum, T. mentagrophytes, T. verrucosum, T. violaceum), Microsporum canis and Epidemophyton floccosum.

Yeast infections of the skin, principally those caused by genus Candida (e.g. candida albicans).

Pityriasis (tinea versicolor due to pityrosporum orbiculaire (also known as malassezia furfur)  
For the treatment of Plantar –type tinea pedis (Moccasin type)

**. ברצוננו להודיע שהעלון לצרכן עודכן, בפירוט שלהלן כלולים העדכונים העיקריים בלבד (תוספות מסומנות בקו תחתון והסרות מידע כקו מחוק) :**

**מתי אין להשתמש בתכשיר?**

אין להשתמש אם ידועה לך רגישות לאחד ממרכיבי התרופה.  
אין להשתמש בתכשיר אם הינך מניקה.

**אין להשתמש בתרופה מבלי להוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול:**  
**אם הינך בהריון או מתכננת הריון שליש ראשון/אחרון או מניקה**

**תגובות בין תרופתיות:**

אם הינך נוטל/ת תרופה נוספת, או אם גמרת זה עתה הטיפול בתרופה אחרת, עליך לדווח לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים או אי-יעילות הנובעים מתגובות בין תרופתיות.  
אין למרוח תכשירים רפואיים נוספים על האזור המטופל

**תופעות לוואי:**

בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה, בזמן השימוש בה עלולות להופיע השפעות לוואי, כגון: גרוד וקילוף בעור  
תופעות לוואי שאינן שכיחות: פצעים, גלד והפרעות בעור, שינוי בגוון העור, אדמומיות, צריבה וכאב בעור, וכן כאב וגירוי במקום המריחה  
תופעות לוואי נדירות: יובש בעור, אקזמה.

גירוי ועקצוץ מקומי, אדמומיות. אם התופעות הנ"ל מתמשכות ו/או מטרידות יש לפנות לרופא.

תופעות לוואי המחייבות התייחסות מיוחדת:

תגובה אלרגית (נדיר):

הפסק/י את הטיפול ופנה/י לרופא באם מופיעים סימנים של היכולים להיות סימפטומים של תגובה אלרגית: קושי בנשימה ובבליעה, התנפחות של הפנים, שפתיים, לשון או גרון, גרד חמור בעור בליווי אדמומיות או שלפוחיות מורמות. בכל מקרה שבו הינך מרגיש/ה תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה, או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית, עליך להתייעץ עם הרופא מיד.

**מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת מרופא:**

פטרת כף הרגל המופיעה בין אצבעות הרגליים (Tinea Pedis), פטרת המפשעה, פטרת הגוף – למרוח פעם עד פעמיים ביום למשך שבוע ימים.

פטרות כף הרגל המופיעה על כף הרגל ו/או צידי הרגל [Plantar –type Tinea Pedis( Moccasin Type)] – למרוח פעמיים ביום למשך שבועיים.  
 פיטיריאסיס ורסיקולור (פטרות השמש) – למרוח פעם עד פעמיים ביום, למשך שבועיים.  
 לחות מעודדת את צמיחת הפטריות, לכן יש לשמור על יובש במקום הנגוע. יש לרחוץ ולייבש בייסודיות את האזור הנגוע לפני כל מריחה של התרופה. יש לעסות את התכשיר בעדינות על האזור הנגוע ומסביבו אם הטיפול ברגליים – יש להקפיד על רחיצה יסודית וייבוש, במיוחד בין האצבעות – רצוי להשתמש בגרביים מכותנה, יש להמנע מללבוש גרביים מצמר או מחומרים סינטטיים. רצוי להחליפם מספר פעמים ביום ( לפי כמות הזיעה). בעונות מתאימות מומלץ לנעול סנדלים ללא גרביים.  
במידה והטיפול הינו בקפלי עור, ניתן לכסות האזור בחבישת גזה, במיוחד בלילה. יש להחליף הגזה בכל ריחה. יש לשטוף הידיים לאחר כל מריחה על אזור הנגוע. יש להמנע מלגרד את האזור.  
 אין לעבור על המנה המומלצת.  
 לשימוש במבוגרים ובילדים מעל גיל 12.  
יש למרוח את הקרם למשך התקופה המומלצת גם אם נראה שיפור במצב לאחר מספר ימים. בדרך כלל הטבה נראית כבר לאחר מספר ימים, אולם הזיהום עלול לחזור אם לא מורחים את הקרם כפי שמומלץ או למשך הזמן המומלץ.  
 אם לא חל שיפור במצבך תוך שבועיים יש לפנות לרופא.  
במידה ושכחת למרוח הקרם בזמן, יש למרוח כשנזכרים ולהמשיך בזמנים כרגיל. אם נזכרת רק בזמן המריחה הבאה, יש למרוח את המנה הרגילה. אין למרוח מנה כפולה במקום המנה שנשכחה

#### **שים לב:**

לא לבלוע! תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד. יש להמנע ממגע עם עיניים, אף או פה או רקמות ריריות אחרות. במידה ויש מגע עם העיניים, יש לשטוף היטב במים. יש לפנות לרופא במידה ויש אי נוחות.  
יש להמנע ממגע של תינוקות בעור המטופל בתכשיר  
מכיוון שהזיהום עלול להיות מדבק, יש להקפיד על מגבת אישית וכדי למנוע זיהום חוזר, יש לכבס אותה בתכיפות

העלון העדכני נשלח למאגר התרופות של משרד הבריאות.  
 ניתן לקבל את העלון המודפס על ידי פניה לבעל הרישום: NCH בע"מ  
 בברכה

הדס אבן-עזרא  
 רוקחת, מחלקת רישום

שביט פרגמן  
 רוקח ממונה